

PROSTATITIS FÚNGICAS

Emilio Mayayo



Daniel, siempre en nuestro corazón



PATOLOGÍA PROSTÁTICA

- Lo primero que se piensa cuando hay clínica prostática es en CARCINOMA
- Es mucho más frecuente la Hiperplasia adenomatosa o adenomiomatosa
- Pero es muchísimo más frecuente las PROSTATITIS

PROSTATITIS


- NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH:
 - Prostatitis aguda bacteriana
 - Prostatitis crónica bacteriana
 - Prostatitis crónica no bacteriana y síndrome de dolor pélvico
 - Prostatitis inflamatoria asintomática

PROSTATITIS

- Prevalencia del 10% de población
- 8% de la consultas de urología
- 1% de las consultas medicina general
- Entre 36 y 65 años
- 30-50% sufrirán del proceso
- Riesgo entre 20-50% de recurrencia
- Gran gasto sanitario

PROSTATITIS

- 5-10% DE ORIGEN BACTERIANO
- 90-95% DE ORIGEN NO BACTERIANO
- *E. coli* (80%) de las bacterianas
- *Proteus m, Klebsiella, Enterobacter, Pseudomona, Serratia*
- *Chlamydia, Mycobacterium tbc, N. gonorrhoea*



Prostatitis crónica

PROSTATITIS

- POR HONGOS ES POCO FRECUENTE
 - *Candida* spp
 - *Cryptococcus neoformans*
 - *Histoplasma capsulatum*
 - *Blastomyces dermatitidis*
 - *Coccidioidomyces immitis*
 - *Paracoccidioidomyces brasiliensis*

PROSTATITIS FÚNGICAS

- NÓDULO O NÓDULOS
- DOLOR
- DISURIA
- PSA ELEVADO
- ZONA INDURADA

- CANDI, CRIPTO,...URIA


PROSTATITIS FÚNGICAS


- LEUCEMIAS/LINFOMAS
- TRANSPLANTADOS
- DIABÉTICOS
- CIRRÓTICOS
- SIDA
- CORTICOIDES
- SIN ANTECEDENTES

PROSTATITIS FÚNGICAS

- *Candida albicans* 9 casos
- *Candida glabrata* 2 casos
- *Candida tropicalis* 2 casos
- *Candida parapsilosis* 1 caso

- *Criptococcus neoformans* 30 casos







PROSTATITIS FÚNGICAS

- Aspergillus 13 casos
 - *Aspergillus* spp 7 casos
 - *A. fumigatus* 3 casos
 - *A. terreus* 3 casos



Zigomicosis no ha sido descrita








PROSTATITIS FÚNGICAS

- Hongos dimórficos:
 - *Histoplasma capsulatum* 11 casos
 - *Paracoccidio brasiliensis* 12 casos
 - *Coccidioido immitis* 30 casos
 - *Blastomyces dermatitidis* 15 casos
- Otros hongos hallados:
 - *Cladophialophora carrioni* (feohifomicosis)
 - *Encephalitozoon hellen* (microsporidiosis)









PROSTATITIS FÚNGICAS

- POCO FRECUENTES
- PRÓSTATA RESERVORIO
- ZONAS ENDÉMICAS (Residentes o también viajeros)
- PACIENTES INMUNOCOMPROMETIDOS
- PENSAR EN HONGOS



Cádiz 2012. Puesta de sol desde el parador